



Digitized by the Internet Archive in 2017 with funding from Wellcome Library











## METODO

paru carar tos primeros ataques de la Còlera morbus; esplicado con claridad para que todos lo entiendan.

La primera bebida, que se debe dar prontamente al que se sienta atacado de la colera, es la sigmente:

Se coge un pozuelo ò una taza, y en ella se echan tres cucharadas de agua de canela, (a) media cucharada de zumo de limon, media cucharada de jarave de limon y lo que pesa un real de sal de agenjos: al tiempo de echar la sal se levanta espuma, y luego luego, antes que se apague, se le ha de dar al enfermo.

Si continuan la vasca, el dolor de estomago y las evacuaciones à la media hora de tomada la bebida antecedente, se le darà una taza de agua de

manzanilla bastante cargada.

Si todavia continuaren la vasca, las evacuacios nes y el dolor de estômago, se le darà otra taza de agua de manzanilla con seis ù ocho gotas de laudano; pero mucho cuidado, porque si se echan mas gotas

de làudano, le harà dano al enfermo.

Si siente calambres, compreu en la botica unguento nervino, y con él denle friegas, calentandose la mano, y ya se entiende que desde el principio han de abrigar bien al enfermo, porque el aire hace gran perjuicio: y en este caso se le daràn fricgas con la tintura siguiente. A una botella de aguar e diente de ochenta grados se pondrán cuatro cucharadas de mostaza en polvo. Dos idem de pimienta y una de tabaco.

Si à pesar de lo dicho el enfermo se siguiere agravando, hagan empeño porque lo vea pronto un

médico.

PUEBLA: 1833.
Reimpresa en la osicina del Supremo Gobierno.

<sup>(</sup>a) La agua de canela se hace como el café, esto es, á una taza de agua hirviendo se le echa la octava parte de una onza de canela, y se deja reposar un ratito: se puede usar tibia ò fria; pero será mejor usar de la de manzanilla. (GRATIS.)













